

# PHENO TURDIDES : premiers résultats











**STATION DE LA CROMPE**





**STATION DE LA CROMPE**



**Dispositif :**

**8 filets de 12 mètres en maille de 16,  
disposés en « L », Milieu très ouvert.**





**Une session par semaine, sessions de 2h30, à partir du lever du jour**








**Repasse : en simultané :**

- Merle noir (chant)**
- Grive musicienne (chant+cri de contact)**
- Grive mauvis (chant+cri de contact)**

# Résultats




**31 Espèces capturées en 3 saisons, place des espèces cibles :**

**Toutes espèces : 1026 captures (923 B, 103 C)**

**Turdidés : 156 captures (151 B, 5 C)**




# Résultats



**Captures relatives des espèces cibles/autres espèces :**  
**Captures des espèces-cibles additionnées assez régulières toute la saison**




# Résultats



**Captures relatives des espèces cibles/autres espèces :**  
**Captures des espèces-cibles additionnées assez régulières toute la saison**



# Résultats



**Captures relatives des espèces cibles/autres espèces :**  
Captures des espèces-cibles additionnées assez régulières toute la saison



# Résultats



Premières impressions : captures régulières de merles et de grives

Captures des turdidés les sur première et deuxième tournées : au sud-ouest rien de nouveau



# Résultats

**Réflexions Esotero-Philosophiques sur le dispositif : milieu, disposition des filets, côté pratique (bague à la maison ...), améliorations, ...**




# Résultats

<b>SAISON/ANNEE</b>	<b>TURILI</b>	<b>TURMER</b>	<b>TURPHI</b>	<b>Total général</b>
<b>2015</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
<b>2016</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
<b>2017</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>68</b>
<b>Total général</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>90</b>	<b>156</b>

**Captures des espèces cibles sur 3 saisons**




# Résultats



Captures des espèces cibles sur 3 saisons




# Résultats



Phenologie des espèces cibles




# Résultats



Phenologie des espèces cibles



# Résultats



Phenologie des espèces cibles





**Captures additionnée des espèces cibles assez constante, avec qqs « pics »,  
Comparaison avec le Fort-Vert (Trektellen):**

- **TURILI : peu de captures (62 : fin oct), Hivernantes ?**
- **TURMER assez aléatoire (62 : 1-10 nov)**
- **TURPHI : comparable au 62, toute proportion gardée (pic autour du 15 oct)**
- **Capture une fois par semaine : risque de manquer les « grosses nuits » de passage**
- **+ ??? (phénologie par classe d'âge,,,)**